



# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению препарата

### Ацербин

**Регистрационный номер:** П N014168/01

**Торговое название:** Ацербин

**Лекарственная форма:** Раствор для наружного применения

**Состав:**

100 г содержат:

Активные вещества: DL – яблочная кислота – 2,153 г; бензойная кислота – 0,154 г;  
салициловая кислота – 0,041 г;

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 39,439 г, очищенная вода – 58,213 г.

**Описание:** Прозрачная жидкость желтоватого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое средство.

**Код АТХ:** [D08A]

**Фармакологическое действие:**

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.

**Показания к применению:**

При комплексном лечении поверхностных ожогов кожи, длительно незаживающих ран, трофических язв и пролежней.

**Противопоказания:**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение препарата во время беременности и кормлении грудью.

**Способ применения и дозы:**

Наружно, после хирургической обработки ран и ожогов раствор наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или раствор наносят на перевязочный материал, а затем на рану 2-3 раза в день. После начала эпителизации наносить 1 раз в день.

В случае отсутствия аллергических реакций лечение может продолжаться до полного заживления раны или ожога.

**Побочное действие:**

Жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. Возможны аллергические реакции.

**Передозировка:**

Случаев передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесёнными на ту же область.

**Особые указания:**

Избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.

Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.

При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под наблюдением врача.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Не влияет.

**Форма выпуска:**

По 80 мл в пластиковый флакон с распыляющей насадкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

По 1000 мл в пластиковую бутылку. По 50 бутылей вместе с равным количеством инструкций упаковывают в транспортную тару. Бутылки по 1000 мл предназначены для стационара.

**Срок годности:**

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Специальные меры предосторожности при утилизации неиспользованного препарата:**

Не требуются.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в местах недоступных для детей.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта врача.

**Предприятие-производитель:**

«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»,

Зальцбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрия

**Претензии потребителей направлять по адресу:**

Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.»,

Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр. 3

Тел./ факс 8 (495) 781 71 08